

Δ4-Ανδροστενδιόνη (Δ4Α)

Οδηγίες Προετοιμασίας & Χρονοδιάγραμμα Αιμοληψίας

Η Δ4-Ανδροστενδιόνη είναι ένας σημαντικός ανδρογόνος δείκτης που βοηθά στην αξιολόγηση της λειτουργίας των επινεφριδίων και των γονάδων (ωοθηκών ή όρχεων).

1. Χρόνος Αιμοληψίας

- **Πρωινή Προσέλευση:** Η αιμοληψία πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά τις **πρωινές ώρες**, καθώς τα επίπεδα της ορμόνης παρουσιάζουν σημαντική ημερήσια διακύμανση (κιρκιάδιος ρυθμός).

2. Ειδικές Οδηγίες για Γυναίκες

Λόγω των μεταβολών της ορμόνης κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου, η εξέταση προτείνεται να διενεργείται στα εξής χρονικά διαστήματα:

- **Α΄ Φάση Κύκλου:** Μεταξύ της 1ης και 5ης ημέρας του κύκλου.
- **Β΄ Φάση Κύκλου:** Τις τελευταίες 15 ημέρες του κύκλου (μετά την ωορρηξία).
- Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τη συγκεκριμένη οδηγία του θεράποντος ιατρού σας.

3. Γενικές Πληροφορίες

- **Νηστεία:** Συνιστάται ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός (αποχή από τροφή για 10-12 ώρες).
- **Φαρμακευτική Αγωγή:** Ενημερώστε το προσωπικό των **Διαγνωστικών Εργαστηρίων "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"** εάν λαμβάνετε ορμονικά σκευάσματα, αντισυλληπτικά ή κορτιζονούχα φάρμακα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίπεδα της Δ4Α.

Στα **Διαγνωστικά Εργαστήρια "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"**, η σωστή χρονική στιγμή της εξέτασης αποτελεί εγγύηση για την ακρίβεια της διάγνωσης.



«Σκανάρετε εδώ για να βρείτε το κοντινότερο εργαστήριο
& τηλέφωνα επικοινωνίας.»