



Οδηγίες Προετοιμασίας Εξεταζομένου (CT / MRI)
Απεικονιστική Εξέταση με Χορήγηση Ενδοφλέβιου Σκιαγραφικού
(Για άτομα με ιστορικό αλλεργίας)

Η ασφαλής και έγκυρη διενέργεια της απεικονιστικής σας εξέτασης προϋποθέτει την πιστή τήρηση του παρακάτω πρωτοκόλλου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο σκιαγραφικό μέσο.

1. Φαρμακευτικό Πρωτόκολλο (Προετοιμασία)

Για την προστασία του οργανισμού, απαιτείται η λήψη αντιαλλεργικής αγωγής σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν την εξέταση:

- **12 ώρες πριν:** Λήψη 2 δισκίων Medrol 16mg.
- **2 ώρες πριν:** Λήψη 2 δισκίων Medrol 16mg.
- **1 ώρα πριν:** Λήψη 1 αντιισταμινικού δισκίου (π.χ. Zirtek, Xozal,).

2. Απαραίτητες Εξετάσεις & Ιστορικό

- **Έλεγχος Νεφρικής Λειτουργίας (Κρεατινίνη):** Για τη διενέργεια Αξονικής Τομογραφίας (CT), είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου αποτελέσματος κρεατινίνης αίματος (τελευταίου τριμήνου).
- **Ιστορικό Αρχείο:** Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας τυχόν προηγούμενες εξετάσεις (γνωματεύσεις και CD) παρόμοιου τύπου για συγκριτική αξιολόγηση από τους ιατρούς μας.

3. Σημαντικές Επισημάνσεις

- **Σακχαρώδης Διαβήτης:** Η λήψη κορτιζόνης (Medrol) ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή αύξηση των επιπέδων σακχάρου (υπεργλυκαιμία). Απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό σας για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή της διαβητικής σας αγωγής.
- **Νηστεία:** Απαιτείται αποχή από τη λήψη στερεάς τροφής για τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν την εξέταση. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται ελεύθερα.
- **Προσέλευση:** Παρακαλούμε να βρίσκεστε στη γραμματεία των Διαγνωστικών Εργαστηρίων "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 20 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού σας.

Η σωστή προετοιμασία είναι το πρώτο βήμα για μια ασφαλή εξέταση και ένα έγκυρο αποτέλεσμα.



*«Σκανάρετε εδώ για να βρείτε το κοντινότερο εργαστήριο
& τηλέφωνα επικοινωνίας.»*